

WARNING WARNING

強勢外來入侵植物

WARNING WARNING WARNING

WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING

生態殺手
OUT

強勢外來入侵植物 防除系列

香澤蘭



農業部
林業及自然保育署
Forestry and Nature Conservation Agency,
Ministry of Agriculture



WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING

香澤蘭

香澤蘭原產熱帶美洲，在亞洲各國廣泛歸化，為侵略性強之雜草。菊科香澤蘭屬，多年生草本植物，株高可達2公尺；莖直立偶為攀緣性，多分枝，小枝成直角分生，全株密被白色絨毛；單葉，對生偶互生或輪生，三角狀卵形，長3-8公分，寬2-6公分，先端銳尖，基部楔形，粗鋸齒緣，3出脈，柄長1-2公分；多數頭狀花序排成繖房花序，頂生；不具舌狀花；管狀花白紫色，花冠圓柱形，5裂；瘦果黑色，圓柱狀，5稜，具白色冠毛。



防治方法

香澤蘭以人工防除為主，為預防產生大量種子傳播，**最佳防治時間為10-11月開花前連根移除**，以減少族群開花結實數量，且橫走根狀莖亦需拔起清除，減少生長新根與新植株之無性繁殖。



危害情況

香澤蘭的繁殖方式包含橫走的根狀莖和隨風飄揚的種子，常見於南部海拔1000公尺以下的林地、林緣、林內曠地、荒地、田埂、河床及荒廢農田，取代原生植物，**霸占棲地而導致豐富多樣性之植物相逐漸消失。**

